



Dotation médicale pour un éloignement jusqu'à 6 milles d'un abri*
(Extrait de l'annexe 224-A5)

	Effet Thérapeutique	Dénomination	Présentation	Commentaire
Allergologie	Traitement état de choc Réaction allergique sévère Allergie peu sévère	ANAPEN CELESTENE 8 mg SOLUPRED 20 oro	Seringue auto-injectable Seringue auto-injectable Comprimé (fond sur la langue) (respecter les contres indications)	Sur ordonnance 41,94 € Sur ordonnance 3,07 € Sur ordonnance 4,89 €
	Antihistaminique	KESTINLYO	Comprimés à sucer	Sur ordonnance 11,62 €
Antalgiques /Antispasmodiques /antipyrétiques	Anti-fièvre et douleur Anti-spasme (douleur au ventre) Anti-diarrhée Antiémétiques (nausées-vomissements)	Efferalgan Oro disper Aspégic Spasfon lyc Loperamide (imodium) Vogalène lyc Nautamine	Comprimés dispersibles dans la bouche Sachets 500 mg Comprimés a faire fondre sur la langue ou dans un peu d'eau Prendre sous forme dispersible Comprimés a faire fondre sur la langue ou dans un peu d'eau	
Cardiologie	Angine de poitrine (cœur)	Natispray 0,15	Pulvérisations buccales	Sur ordonnance 4,36 €
Dermatologie	Désinfectant des plaies Désinfectant liquide Brûlures, coups de soleil Pommade désinfectante Ecran total solaire Piqures d'insectes et Allergies Pour une anesthésie locale	Chlorohexidine Septéal, Biseptine Biafine Auréomycine ou Fucidine Soleil biafine Sénophile, Locoïd 0,1% EMLA 5%	Lingettes ou dosettes de 5 ml Solutions application cutanée Emulsion pour application cutanée Pommade Crème Crème	Indice supérieur à 50 Sur ordonnance 5,08 €
*Ophtalmologie	Collyre anti-irritation	Antalyre Multicrom unidoses	Dosettes Dosettes	A titre d'exemple
*Bobologie	Anti saignements (nez plaies) Rapprochement des plaies	*Coalgan *Stéristrip	mèches	
Accessoires		Bandes type Cohéban n°1583 Compresse stériles Gants jetables Couverture de survie Epingles de sûreté	Bande auto adhésive	

Et pour les pêcheurs, une pince coupante, un scalpel, une pince porte aiguille ou a clamper (pour bien saisir l'hameçon), une pince à épiler, une grosse aiguille, une paire de ciseau,

Pour les diabétiques, les cardiaques, et les autres, NE JAMAIS OUBLIER D'APPORTER UN A DEUX JOURS D'AVANCE DE SON TRAITEMENT SUR LE BATEAU (on sait quand on part mais pas toujours quand on revient...)